

13. Pijnstiller/ koortsremmer (grote pakket) NIET VOOR DE KAT!

Carprodyl geef je bij koorts en bij pijn. Gebruik carprodyl niet indien je hond spuugt of diarree heeft. Voor buikpijn is dit niet het geschikte middel . Maar bij milde kreupelheid of bij koorts is dit een zeer geschikt middel om te gebruiken.

Neem bij twijfel contact op met een dierenarts om te overleggen.

Dosering: 50 mg voor de kleine hond

Hond: 3-6 kg: 1 x daags $\frac{1}{4}$ tablet ingeven

Hond: 6-9 kg: 1 x daags $\frac{1}{2}$ tablet ingeven

Hond: 9-12 kg: 1 x daags $\frac{3}{4}$ tablet ingeven

Hond: 12-15 kg: 1 x daags 1 tablet ingeven

Dosering: 120 mg voor de grote hond:

Hond 15 tot 21,5 kg: 1 x daags $\frac{1}{2}$ tablet ingeven

Hond 21,5 tot 28 kg: 1 x daags $\frac{3}{4}$ tablet ingeven

Hond: 28 tot 37 kg: 1 x daags 1 tablet ingeven

Hond 37 tot 45 kg: 1 x daags 1 + $\frac{1}{4}$ tablet ingeven

Hond 45 tot 52 kg: 1 x daags 1 + $\frac{1}{2}$ tablet ingeven

Hond 52 tot 60 kg: 1 x daags 1 + $\frac{3}{4}$ tablet ingeven

Hond 60 tot 70 kg: 1 x daags 2 tabletten ingeven

De tabletten mogen met wat voeding ingegeven worden.

